



MERKBLATT FÜR PATIENTEN UND ELTERN

Retentionsgeräte

(Herausnehmbare Spangen, Kleberetainer)

Ziel: Stabilisierung des Behandlungsergebnisses

Trageweise der herausnehmbaren Geräte:

- nachts tragen, ca. 8 - 10 Stunden
- nicht beim Essen, Trinken, Zähneputzen und beim Sport tragen
- in der Schule eher nicht tragen (erschwerter Sprache, Verlustgefahr)

Pflege/Aufbewahrung

- mit Zahnbürste oder Handwaschbürste kräftig und von allen Seiten abscrubben
- eventuell zusätzlich 1 mal pro Woche für 1/2 Stunde in Essig legen, danach nochmals reinigen
- möglichst trocken in der Spangenbox aufbewahren

eventuelle Anfangsprobleme

- erschwerte, undeutliche Aussprache
- erhöhte Speichelproduktion
- Spangen fallen nachts raus

- Druckstellen/scharfe Kanten

Lösungen

- normalisiert sich
- lässt nach
- längere Eingewöhnungszeit nötig dann auch nachmittags tragen
- möglichst umgehend vorbeikommen

Kleberetainer (Draht an der Innenseite der Unterkieferfront)

- möglichst kein Karamell (z.B. Bonbons) essen
- falls sich eine Klebestelle löst, bitte umgehend bei uns melden
- intensive Zahnpflege notwendig

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung

Liebe Patienten & liebe Eltern, bitte beachten:

Werden die Retentionsgeräte nicht regelmäßig, nach der Anweisung des Behandlers getragen, besteht ein sehr großes Risiko für eine Verschiebung der Zähne (Rezidiv).

Das würde dann eventuell eine erneute Korrektur erforderlich machen!

